

Психические расстройства у представителей финно-угорского этноса в тверском регионе

Б.Н. Кузьмичев

г. Тверь

Проведенные в последние годы в РФ многочисленные этнокультуральные исследования показали существенные различия в распространенности, клинике, динамики и терапии психических расстройств (Т.Б. Дмитриева, Б.С. Положий, 1996; Б.С. Положий, А.А. Чуркин, 1996—2002 гг). При этом, в основном, исследования касались крупнейших этнических групп: славянской, тюркской, финно-угорской и северокавказской. Представители финно-угорской субпопуляции в РФ проживают в Республике Коми, Удмуртии, Карелии. На территории Тверского региона проживает около 25 тыс. карел, переселившиеся сюда из Приладожья в XVI-XVIII веках. Их основная часть (примерно 2/3) проживает в довольно компактном ареале, лежащем к северу от областного центра и включает значительную часть Рамешковского, северо-восточные части Лихославльского и Спировского районов, южную половину Максатихинского. Население бывшего Толмачевского района, территория которого теперь почти полностью входит в Лихославльский, в 1930 году на 95% состояло из карел. В Лихославльском, Рамешковском, Максатихинском и Спировском районах доля карельского населения составляла соответственно 56, 46, 45 и 33%. Кроме этих районов она была значительной еще в Весьегонском, Калининском, Зубцовском и Сонковском районах. Результаты исследования 104 подростков карельской субпопуляции, страдающих легкой умственной отсталостью (УО), достоверные отличия по психопатологической отягощенности наследственности, по сравнению со славянскими сверстниками с УО. У представителей финно-угорского этноса наблюдался более высокий удельный вес отягощенностью алкоголизмом родителей, составивший 47,1%, умственной отсталостью легких степеней (15,4%) и непсихотическими психическими расстройствами (5,8%). Полученные цифры превышали аналогичные показатели в славянской субпопуляции соответственно в 1,4; 3,7 и 5,8 раз ($p < 0,05$). Ведущими синдромами, осложняющими течение УО, которые преобладали у карел по сравнению со славянами были эмоционально-волевой неустойчивости (61,5% случаев) и психопатоподобный синдром с повышенной сензитивностью и идеями отношения (7,7%). Примечательно, что у умственно отсталых подростков финно-угорского этноса достоверно чаще предусматривали поведение, допускающее возможность суицида (32,7% против 1,9% у славян), а четверть обследованных даже одобряли суицид, как форму выхода из неразрешимой ситуации (против 7,4% у славян). Таким образом, существуют определенные отличия в показателях распространенности и клинике психических расстройств у представителей финно-угорского этноса в Тверском регионе, что требует дальнейшего пристального изучения.