

**Представления населения о психических
расстройствах и отношение населения к
психически больным в
интернациональном сравнении**


Matthias C. Angermeyer

Факторы, определяющие взгляды и мнение населения о психических расстройствах и отношении к психически больным




Этикетирование симптомов психических расстройств

Результаты опросов населения в Германии (2001),
Братиславе (2003) и Новосибирске (2002)




Указание наследственных факторов как причины развития психических расстройств

Результаты опросов населения в Германии (2001),
Братиславе (2003) и Новосибирске (2002)



Указание болезни головного мозга как причины развития психических расстройств

Результаты опросов населения в Германии (2001),
Братиславе (2003) и Новосибирске (2002)



Указание стресса на работе как причины развития психических расстройств

Результаты опросов населения в Германии (2001),
Братиславе (2003) и Новосибирске (2002)




Указание отсутствия социальной поддержки как причины развития психических расстройств

Результаты опросов населения в Германии (2001),
Братиславе (2003) и Новосибирске (2002)




Указание сложной семейной обстановки в детстве как причины развития психических расстройств

Результаты опросов населения в Германии (2001),
Братиславе (2003) и Новосибирске (2002)




Указание отсутствия родительского внимания как причины развития психических расстройств

Результаты опросов населения в Германии (2001),
Братиславе (2003) и Новосибирске (2002)




Указание злоупотребления алкоголем как причины развития психических расстройств

Результаты опросов населения в Германии (2001), Братиславе (2003) и Новосибирске (2002)




Указание злоупотребления наркотиками как причины развития психических расстройств

Результаты опросов населения в Германии (2001),
Братиславе (2003) и Новосибирске (2002)




Стереотипы в отношении психических расстройств: Отсутствие силы воли

Результаты опросов населения в Германии (2001),
Братиславе (2003) и Новосибирске (2002)




Указание аморального образа жизни как причины развития психических расстройств

Результаты опросов населения в Германии (2001),
Братиславе (2003) и Новосибирске (2002)




Указание божьей воли как причины развития психических расстройств

Результаты опросов населения в Германии (2001),
Братиславе (2003) и Новосибирске (2002)



Указание бессознательного конфликта как причины развития психических расстройств


Результаты опросов населения в Германии (2001),
Братиславе (2003) и Новосибирске (2002)



Ассоциация шизофрении с расщеплённой личностью


Ответы на открытый вопрос

Результаты опросов населения в Германии (2001)
и Новосибирске (2002)



Рекомендации к помощи в случае психического расстройства: Психиатр

Результаты опросов населения в Германии (2001),
Братиславе (2003) и Новосибирске (2002)




Рекомендации к помощи в случае психического расстройства: Врач общего профиля

Результаты опросов населения в Германии (2001),
Братиславе (2003) и Новосибирске (2002)




Рекомендации к помощи в случае психического расстройства: Священник

Результаты опросов населения в Германии (2001),
Братиславе (2003) и Новосибирске (2002)




Рекомендации к помощи в случае психического расстройства: Доверенное лицо

Результаты опросов населения в Германии (2001),
Братиславе (2003) и Новосибирске (2002)



Рекомендации к помощи в случае психического расстройства: Группа взаимопомощи


Результаты опросов населения в Германии (2001),
Братиславе (2003) и Новосибирске (2002)



Рекомендации к лечению психических расстройств:

Психотропные препараты


Результаты опросов населения в Германии (2001),
Братиславе (2003) и Новосибирске (2002)



Рекомендации к лечению психических расстройств:


Психотерапия

Результаты опросов населения в Германии (2001),
Братиславе (2003) и Новосибирске (2002)




Рекомендации к лечению психических расстройств: Медитация / Йога

Результаты опросов населения в Германии (2001),
Братиславе (2003) и Новосибирске (2002)



Рекомендации к лечению психических расстройств: Техники расслабления

Результаты опросов населения в Германии (2001),
Братиславе (2003) и Новосибирске (2002)



Выражение пожелания социальной дистанции по отношению к психически больным: Нежелание работать вместе с психически больным

Результаты опросов населения в Германии (2001),
Братиславе (2003) и Новосибирске (2002)



Выражение пожелания социальной дистанции по отношению к психически больным: Нежелание жить по соседству с психически больным

Результаты опросов населения в Германии (2001),
Братиславе (2003) и Новосибирске (2002)



Выражение пожелания социальной дистанции по отношению к психически больным:

Отказ в сдаче квартиры в аренду

Результаты опросов населения в Германии (2001),
Братиславе (2003) и Новосибирске (2002)



Резюме (1)

- Сравнение результатов опросов в Германии, Словакии и России выявило как сходства так и различия во взглядах и мнениях населения о большой депрессии и шизофрении, а также сходства и различия в отношении населения к лицам, страдающим психическими расстройствами.
- Сходства выявились, главным образом, в отношении установившихся у населения концепций происхождения большой депрессии и шизофрении, в отношении указания на необходимость в обращении к психиатру и в отношении рекомендации принятых методов лечения.
- Различия между тремя странами, обычно по градиенту от Германии через Словакию к России, или наоборот, были найдены в отношении следующих пунктов:

Резюме (2)

- Эtiquетирование симптомов указанных двух психических расстройств как выражения или депрессии, или психоза / шизофрении (наиболее часто в Германии).
- Указание более традиционных этиологических концептов (отсутствие силы воли, аморальный образ жизни, воля Божья), а также указание на проблемы в области социальных отношений и злоупотребления алкоголем и наркотиками (наиболее часто в России).
- Указание бессознательного конфликта как причины развития психических расстройств (наиболее часто в Германии).
- Рекомендации к поиску помощи у врача общего профиля, священника или доверенного лица (наименее часто в Германии), рекомендация посещения группы взаимопомощи (наиболее часто в Германии).
- Рекомендация занятий медитацией / йогой и техниками расслабления (наиболее часто в Германии).
- Выражение желания социальной дистанции (наиболее часто в России).

Заключение

- Результаты опросов указывают на явное влияние социокультурных факторов на взгляды и мнения населения о психических расстройствах и на отношение населения к психически больным.
- Основываясь на данных наблюдений в Германии, можно прогнозировать определённое сглаживание указанных различий между Германией, Словакией и Россией в течение последующих лет.